

## ■ Glasgow Coma Scale (全年齡用)

|               | 成人、4才以上          | 4才未満の小児                   | 乳幼児            |
|---------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 開眼<br>(E)     | 4 自発的            | →                         | →              |
|               | 3 呼びかけに          | →                         | →              |
|               | 2 痛みに            | →                         | →              |
|               | 1 反応なし (開眼せず)    | →                         | →              |
| 言語反応<br>(V)   | 5 反応正常           | 見当識正常、社交的応答               | 喃語 (アーウー、バブバブ) |
|               | 4 混乱した会話         | 見当識障害、混乱した会話、機嫌は直る、覚醒している | 興奮した泣き声        |
|               | 3 発語あるが無意味       | 不適當な言葉、機嫌は直らない、覚醒していない    | 痛みへの泣き声        |
|               | 2 うめき、理解不能音      | 理解不能、興奮、落ち着きのなさ、覚醒していない   | 痛みへのうめき        |
|               | 1 反応なし (発語なし)    | →                         | →              |
| 最良運動反応<br>(M) | 6 指示に従う          | 正常、自発的運動                  | →              |
|               | 5 痛み部位を認識する      | →                         | 触れると逃避         |
|               | 4 痛みに反応又は逃避      | 痛みに逃避                     | →              |
|               | 3 除皮質屈曲 (上肢異常屈曲) | →                         | →              |
|               | 2 除脳伸展 (四肢異常伸展)  | →                         | →              |
|               | 1 反応なし           | →                         | →              |

## ■ GCS による重症度

3 ~ 8 (重症)、 9 ~ 12 (中等症)、 13 ~ 15 (軽症)